


Avertissements agricoles



BULLETIN PÉRIODIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES DE
BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTÉ

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Z.I. NORD - B.P. 194 - 21206 BEAUNE CÉDEX



ABONNEMENT ANNUEL : 105 F Régisseur Recettes D.D.A. CCP DIJON 3405-12 K

☎ (80)22.19.38

ÉDITION GRANDES CULTURES

Bulletin n° 16 - 13 juin 1985

COLZA

ALTERNARIA :

- . Les symptômes de cette maladie sont toujours rares.
- . En situation tardive, la période limite d'intervention sera très prochainement atteinte, (20-25 juin). Les traitements sont très rarement justifiés.

POIS

Le bon état sanitaire des parcelles se maintient ; les traitements fongicides ne sont pas justifiés.

CEREALES

CE QUI EST URGENT

- . Protection fongicide sur blé d'hiver en zones tardives.

CE QUI PEUT ETRE UTILE

- . Protection fongicide sur orge de printemps non épiée en zone d'altitude.

CE QUI EST INUTILE

- . Adjonction systématique d'un insecticide aux fongicides céréales.
- . Application insecticide sur maïs.

BLE D'HIVER

STADE VEGETATIF : Fin épiaison (zones tardives ou d'altitude) à grain laiteux.

MALADIES : Stagnation de la rouille brune à la faveur de la baisse des températures observée depuis le 8 juin. Faible évolution de l'Oïdium plus marquée pour la Septoriose présente sur F2 et localement F1 (ne pas confondre cette maladie avec des jaunissements d'origines diverses).

RAVAGEURS : Très faible évolution des pucerons en raison de l'action conjuguée de la climatologie défavorable et de l'augmentation sensible du nombre de prédateurs (auxiliaires).
Fin de risque Cécidomyies dans les parcelles en fin floraison ou au stade grain laiteux.

P. 27

STRATEGIE :

Dans la majorité des situations la protection est déjà en place et ne mérite aucun renouvellement lorsqu'elle a été appliquée correctement à la mi-épiaison.

Pour les zones tardives qui recouvrent souvent les secteurs situés en altitude la stratégie développée dans notre dernier bulletin reste valable à savoir :

- fongicide polyvalent (Septorioses, Rouille, Oïdium)
- pas d'insecticide sauf dans le cas particulier de pullulations de pucerons qui est rare.
- application avant la fin épiaison.

ORGE DE PRINTEMPS

L'épiaison est souvent terminée (plaine) et il est donc trop tard pour intervenir.

Cependant en zone très tardive (altitude) une protection visant l'Oïdium et la Rhynchosporiose s'avère nécessaire au plus tard à la sortie des barbes. Nous vous déconseillons cette intervention en zone de plaine sur des semis tardifs car sa rentabilisation paraît le plus souvent aléatoire.

MAIS

Peu ou pas de pucerons (ils sont encore sur le blé) et de ce fait le risque de blocage de la croissance par *Métopolophium dirhodum* est à exclure cette année pour les semis antérieurs au 12 mai. **Insecticide inutile actuellement.**

Compte tenu de l'évolution des larves de pyrale (début de nymphose à partir du 10 juin) il semble que l'on se dirige vers des interventions insecticides classiques durant la première moitié de juillet.

CULTURES LEGUMIERES

POMME-DE-TERRE

MILDIOU : Envisagez un renouvellement

PUCERONS - DORYPHORES : A surveiller

En présence de pucerons ou de larves de doryphores, envisagez une application insecticide. Un traitement mixte fongicide-insecticide est possible.

*

*

*